


乳幼児期に受ける定期予防接種《参考例》

川越市

年齢(月齢) ワクチン	2か月	3か月	6か月	7か月	9か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	7歳 6か月	8歳
B型肝炎	↓	↓			↓									
		2回目 1回目から27日以上の間隔を おいて接種			3回目 1回目から139日以上の間隔を おいて接種									
標準的には、生後2か月から生後9か月未満に3回接種														
ヒブ ※生後2か月から生後7か月未満 に接種を開始した場合	↓	↓	↓			↓								
	初回	27日から56日の間隔を おいて3回接種				追加 初回終了後、7か月から13 か月の間隔を おいて接種								
接種開始年齢によって、接種回数、接種間隔が 異なります。詳しくは、説明書をお読みいた だくか、予防接種担当にお問い合わせください。														
小児用肺炎球菌 ※生後2か月から生後7か月未満 に接種を開始した場合	↓	↓	↓			↓								
	初回	27日以上の間隔を おいて3回接種				追加【生後12か月以降に 接種】 初回終了後、60日以上の間隔を おいて12か月から15 か月未満に接種								
四種混合 〔ジフテリア・百日せき 破傷風・不活化ポリオ〕		↓	↓	↓			↓							
		1期初回 20日から56日の間隔を おいて3回接種					1期追加 1期初回終了後、12か月から18 か月の間隔を おいて接種							
BCG			↓											
標準的には、生後5か月から生後8か月未満に接種														
麻しん風しん混合 【MR】						↓							↓	
						1期							2期	
1歳を過ぎたら早めに接種														
小学校就学前の1年間 ※該当年度の4月1日から3月31日 までの間に接種														
水痘(水ぼうそう)														
標準的には、1回目接種を生後12か月から生後15か月未満に開始														
日本脳炎														
生後6か月から接種できますが、標準的には、 1期初回を3歳、1期追加を4歳に接種														
									↓	↓				
									1期初回 6日から28日の間隔を おいて接種	1期追加 1期初回終了後、おおむね1年の 間隔を おいて接種				



対象年齢



標準的な接種期間

この表は、7歳6か月までに受ける定期予防接種の一例です。

接種を受ける前には、必ず説明書をお読みください。不明な点は、医師又は予防接種担当にお尋ねください。